


## แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคหัด

เป้าหมาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรค

### วิธีปฏิบัติ



1. คัดกรองผู้ป่วยทุกราย ทุกคลินิก
  - ถามประวัติเรื่อง ไข้ ออกผื่น
  - ติดป้าย หากมีไข้ ออกผื่น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
  - คลินิกใดพบผู้ป่วยไข้ ออกผื่น ให้ผู้ป่วยใส่ mask และนำผู้ป่วยไปที่จุดตรวจโรคทางเดินหายใจ ด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกโดยไม่ผ่านแผนกผู้ป่วยนอกและไม่ขึ้นลิฟท์
2. เมื่อพบผู้ป่วยดังกล่าว ให้ดูแลแบบกลุ่ม airborne precaution
  - ให้ใส่ surgical mask
  - จัดให้นั่งรอตรวจที่จุดตรวจผู้ป่วยทางเดินหายใจ
  - ติดใบ airborne precaution ที่หน้าใบสั่งยา ส่งใบสั่งยาให้พยาบาลซักประวัติ
  - บริการ one stop service (พยาบาลมาซักประวัติ แพทย์มาตรวจ เกสซ์กรมาจ่ายยา พยาบาลให้คำแนะนำหลังตรวจ)
  - หากนอนพักรักษาในรพ. แจ้งพนักงานเปลทราบ ใส่ mask ถุงมือ และล้างมือหลังถอดถุงมือ
  - ทำความสะอาดรถเข็นด้วย 0.5% sodium hypochlorite
  - หอผู้ป่วยใน รับไว้ในห้องเฉพาะโรค จำกัดญาติเยี่ยม
  - ให้ผู้ป่วยใส่ mask ตลอดช่วงระยะแพร่เชื้อ (2 วันก่อนมีไข้และ 4 วันหลังออกผื่น)
3. รายงานงานระบาด
  - จุดไหนพบผู้ป่วยไข้ ออกผื่น รายงานงานระบาดทันทีเพื่อสอบสวนและควบคุมโรค
  - แพทย์สั่งตรวจ IgM และ swab
  - ห้องแล็บ ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. สุราษฎร์ธานี ฟรี ได้ผลใน 48 ชั่วโมง
  - หากเจ้าหน้าที่ป่วย ให้ลาป่วยอย่างน้อย 4 วันหลังออกผื่น
  - เฝ้าระวังผู้สัมผัส 1 เดือน

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปากพ่อง

6 มกราคม 2563