แบบติดตามการใช้ยา Norepinephrine injection

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย..... HN…… อายุ..... ปี เตียง..... ตึก [ ] ชาย [ ] หญิง [ ] คลอด [ ] OPD

ข้อบ่งใช้ยา [ ] รักษาภาวะ Hypotension/shock

ขนาดยา.....เริ่มวันที่.....เวลา..... น.

รายการยา	การติดตามการใช้ยา/ข้อบ่งใช้การหยุดยา/รายงานแพทย์
Norepinephrine injection **รูปแบบยาใน รพ. : 4 mg/4 ml** **ขนาดยา** **Hypotension/shock:** Continuous I.V. infusion **เด็ก** **ขนาดยาเริ่มต้น** : 0.05-0.1 mcg/kg/min ปรับขนาดยาจนได้ขนาดที่ต้องการ ขนาดยาสูงสุด คือ 2 mcg/kg/min ผู้ใหญ่ **ขนาดยาเริ่มต้น :** 8-12 mcg/min ปรับขนาดยาจนได้ขนาดที่ต้องการ (maximum dose : 30 mcg/min) - **Post cardiac arrest care**: ขนาดเริ่มต้น 0.1-0.5 mcg/kg/minute (7-35 mcg/min ในผู้ป่วยน้ำหนัก 70 kg) **- Sepsis and septic shock:** ขนาดยา 0.01-3 mcg/kg/min (0.7-210 mcg/ min ในผู้ป่วยน้ำหนัก 70 kg) *** ไม่ต้องปรับขนาดยาตามการทำงานของไต	**BP, HR :** วัดทุก 15 นาที เมื่อเริ่มให้ยา จนกระทั่ง BP stable หลังจากนั้นวัดทุก 30 นาที X 2 ครั้ง หลังจากนั้นวัดทุก 1 ชั่วโมง หรือตามคำสั่งแพทย์ **ข้อควรระวัง** - ระวังการรั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือด เพราะจะทำให้เกิดเนื้อตาย - ห้ามใช้ยานี้ฉีดร่วมกับยาชาในบริเวณนิ้วมือ นิ้วเท้า หู จมูก หรืออวัยวะเพศ - ยาที่ผสมแล้ว มีอายุ 24 ชั่วโมง

ผู้เตรียมยา..... ผู้ตรวจสอบ.....

ส่วนที่ 2 การติดตามการให้ยา

ว/ด/ป	เวลา	Mornitoring			Nurse's note	ผู้บันทึก
		BP	HR	RR		