




แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพ่อง

<b>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพ่อง</b>	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
วัน/เดือน/ปี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ: ขออนุมัตินำ รายงาน ผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา Drug Use Evaluation และยาราคาแพง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล	
รายละเอียดข้อมูล : รายงาน ผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา Drug Use Evaluation และยาราคาแพง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ)	
Link ภายนอก: :http:// www.pknhospital.com	
หมายเหตุ: ..... .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>  (นางศรีสุดา สีลาโชติ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>  (นายสมเกียรติ วรรณฤทธิการ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่</b>  (นางสาวอภิรดี เบ้าวงศ์สกุล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	

สรุป DUE Ciprofloxacin inj 200 mg  
มีรายงานการใช้ทั้งหมด 14 ราย

รายการ	ความเหมาะสม(ร้อยละ)
1. ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Empiric 13 ราย ร้อยละ 92.86</li> <li>● Proven 1 ราย ร้อยละ 7.14</li> </ul>
2. ขนาดยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ร้อยละ 100</li> </ul>
3. การปรับยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● H/C 11/14 ราย ร้อยละ 78.57</li> <li>● Proven 1 ราย</li> <li>- De-escalation ยาเป็น oral</li> <li>● Empiric 13 ราย</li> <li>- Stat 1 dose แล้วเปลี่ยนไปใช้ยาอื่น 1 ราย</li> <li>- Dead 1 ราย</li> <li>- De-escalation ยา               <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลังผล H/C ออก 2 ราย</li> <li>- ปรับเป็นยา oral 9 ราย</li> </ul> </li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 92.86</p>
4. ระยะเวลา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ร้อยละ 92.86</li> </ul> <p>*** มี stat ไป 1 dose แล้ว off ยาเลย 1 ราย</p>

## สรุป DUE Piperacillin/Tazobactam (Tazocin)

มีรายงานการใช้ทั้งหมด 23 ราย

รายการ	ความเหมาะสม(ร้อยละ)
1. ข้อบ่งใช้	<ul style="list-style-type: none"><li>● Empiric 20 ราย ร้อยละ 86.96</li><li>● Proven 1 ราย ร้อยละ 4.35</li><li>● กลับจากมหาราช 2 ราย ร้อยละ 8.70</li></ul>
2. ขนาดยา	<ul style="list-style-type: none"><li>● 22 ราย ร้อยละ 95.65</li></ul>
3. การปรับยาหลังผลเพาะเชื้อออก	<ul style="list-style-type: none"><li>● 18 ราย ร้อยละ 90</li></ul>
4. ระยะเวลา	<ul style="list-style-type: none"><li>● ร้อยละ 100</li></ul>

สรุป DUE Meropenam inj

ปีงบประมาณ	2564	2565	2566
1.ร้อยละของการสั่งใช้ยา ที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ยา	100	100	100
2.ร้อยละของการสั่งใช้ยา ที่ถูกต้องตามขนาดยา	62.5	85.71	88.46
3. ร้อยละของความเหมาะสมในการปรับยา หลังผลเพาะเชื้อออก	75	85.71	96.15
4. ร้อยละของความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้ยา	100	100	100