

แบบติดตามการใช้ยา Enoxaparin injection

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย..... HN..... อายุ..... ปี เพศ..... ตึก [] ชาย [] หญิง [] คลอด [] OPD
 ชื่อบ่งใช้ยา [] รักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือหลอดเลือดอุดตัน
 ขนาดยา..... เริ่มวันที่..... เวลา..... น.

รายการยา	การติดตามการใช้ยา/ข้อบ่งใช้การหยุดยา/รายงานแพทย์
<p style="text-align: center;">Enoxaparin injection</p> <p>รูปแบบยาใน รพ. 60 mg/0.6 ml</p> <p>ขนาดยา</p> <p><input type="checkbox"/> Unstable angina high risk Non- ST elevated myocardial infarction (NSTEMI) :</p> <p>- 1 mg/kg SC q 12 hrs ร่วมกับ (2-8 วัน)</p> <p><input type="checkbox"/> Venous Thromboembolic Disease</p> <p>- 1.5 mg/kg SC OD หรือ 1 mg/kg SC BID</p> <p><input type="checkbox"/> High risk patients: obese, iliac vein thrombosis, cancer</p> <p>- 1 mg/kg SC BID</p> <p><input type="checkbox"/> Prophylaxis of Venous Thrombosis</p> <p>- High Risk Patients: 40 mg SC OD (0.4 ml; anti-Xa: 4000 iu)</p> <p>- Moderate Risk Patients: 20 mg SC OD (0.2 ml; anti-Xa: 2000 IU)</p> <p>- Prolonged Thromboprophylaxis: 40 mg OD for 30 post-operative days</p> <p><input type="checkbox"/> Prophylaxis of Venous Thromboembolism</p> <p>- 40 mg SC OD</p> <p><input type="checkbox"/> Prevention of Extra-Corporeal Thrombus During Haemodialysis</p> <p>- 1 mg/kg</p> <p>*** ปรับขนาดยาตามการทำงานของไต โดยเฉพาะในผู้ CrCl < 30 ml/min</p>	<p>HR : วัดทุก 4 ชั่วโมง</p> <p>RR : วัดทุก 4 ชั่วโมง</p> <p>BP : วัดทุก 4 ชั่วโมง</p> <p>Sign of Bleeding</p> <p>- การเกิดจ้ำเลือด ภาวะเลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะสีแดง Hematoma</p> <p>รายงานแพทย์ทันทีที่พบอาการนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sign of Bleeding 2. BP <90/60 mmHg 3. HR > 120 bpm 4. platelet < 100,000

ส่วนที่ 2 การติดตามการให้ยา

2.1 ขนาดยาที่สั่งใช้.....

2.2 ข้อห้ามใช้ : ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา Enoxaparin หรือ Heparin : ใช่ ไม่ใช่

- ไม่ควรให้ยาถ้าเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000/mm³
- ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติ Heparin induce thrombocytopenia (HIT)

2.3 CrCl < 30 ml/min หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

