

# แบบติดตามการใช้ยา Fondaparinux injection

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย..... HN..... อายุ..... ปี เพศ..... ตึก [] ชาย [] หญิง [] คลอด [] OPD

ข้อบ่งใช้ยา [] รักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือหลอดเลือดอุดตัน

ขนาดยา..... เริ่มวันที่..... เวลา..... น.

รายการยา	การติดตามการใช้ยา/ข้อบ่งใช้การหยุดยา/รายงานแพทย์
<p style="text-align: center;"><b>Fondaparinux injection</b></p> <p>รูปแบบยาใน รพ. 2.5 mg/0.5 ml</p> <p>ขนาดยา</p> <p><input type="checkbox"/> Unstable angina high risk Non- ST elevated myocardial infarction ( NSTEMI ) :</p> <p>- 2.5 mg SC วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 8 วัน หรือจนกระทั่งผู้ป่วยออกจาก ร.พ.</p> <p><input type="checkbox"/> Deep Vein thrombosis และ Pulmonary Embolism</p> <p>- น้ำหนัก &lt; 50 kg. นิด 5 mg SC OD นิดติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน</p> <p>- น้ำหนัก 50-100 kg นิด 7.5 mg SC OD นิดติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน</p> <p>- น้ำหนัก &gt; 100 kg นิด 10 mg SC OD นิดติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน</p> <p>*** ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มี CrCl &lt; 30 ml/min</p>	<p><b>HR</b> : วัดทุก 4 ชั่วโมง</p> <p><b>RR</b> : วัดทุก 4 ชั่วโมง</p> <p><b>BP</b> : วัดทุก 4 ชั่วโมง</p> <p><b>Sign of Bleeding</b></p> <p>-การเกิดจ้ำเลือด ภาวะเลือดออกตามไรฟัน</p> <p>-Complete blood count (CBC) โดยเฉพาะ platelet count 2-3 วัน /ครั้ง</p> <p>-sign of bleeding or hematoma</p> <p>-sign and symptom of neurological impairment</p>

ผู้เตรียมยา.....

ผู้ตรวจสอบ.....

## ส่วนที่ 2 การติดตามการให้ยา

2.1 ขนาดยาที่สั่งใช้.....

### 2.2 ข้อห้ามใช้

- เคยมีประวัติการเกิด serious hypersensitivity reaction ต่อยา fondaparinux เช่น angioedema, anaphylactoid หรือ anaphylactic reactions
- Active clinically significant bleeding
- Acute bacterial endocarditis
- Thrombocytopenia associated with positive in vitro test for antiplatelet antibody in the presence of fondaparinux sodium
- Severe renal impairment (CrCl less than 30 mL/min)