แบบติดตามการใช้ยา Streptokinase iniection

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย..... HN…… อายุ..... ปี เตียง..... ตึก [ ] ชาย [ ] หญิง [ ] คลอด [ ] OPD

ข้อบ่งใช้ยา [ ] รักษา Myocardial infarction , severe DVT, Pulmonary emboli

ขนาดยา.....เริ่มวันที่.....เวลา..... น.

รายการยา	การติดตามขณะให้ยา//รายงานแพทย์/ข้อบ่งใช้การหยุดยา
Streptokinase injection **รูปแบบยาใน รพ. 1,500,000 Unit/amp** **ขนาดยา** **Acute myocardial Infraction :** - 1.5 m IU ให้ infusion นานมากกว่า30- 60 นาที **<u>การเตรียมยา</u>** - ดูดสารน้ำจำนวน 3 ml จากถุง NSS หรือ D5W ขนาด 100 ml แล้วนำไปละลาย โดยเติมสารน้ำลงใน vial ช้าๆ แล้วหมุน vial เบา ๆ เพื่อให้ยาละลาย (ห้ามเขย่า) ดูดยาที่ละลายอย่างช้า ๆ แล้วเจือจางกลับลงในถุง NSS หรือ D5W เดิม ใช้ยาให้หมดใน 8 hr - ให้ IV ภายใน30- 60 นาที ด้วยเครื่อง infusion pump เท่านั้น	● **HR, RR, BP :**วัดทุก 5 นาที ขณะให้ยา จากนั้นวัดทุก 15 นาที X 4 ครั้ง; ทุก 30 นาที X 2 ครั้ง ถ้าคงที่วัดทุก 1 ชม. ● **Monitor EKG :** Observe ST elevate, arrthmia ● **ประเมินระดับความรู้สึกตัว และอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท** ● **Observeภาวะ Bleeding** จากส่วนต่างๆของร่างกาย ● **Observe อาการแพ้ยา** ● **ประเมินอาการเจ็บหน้าอก ปวดหลัง** ● **ตรวจ EKG 12 leads** หลังได้รับยา 60 นาที **<u>แจ้งแพทย์กรณีมีอาการดังต่อไปนี้</u>** 1.ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น sustained VT,VF 2.ความดันโลหิตต่ำ (ต่ำกว่าเดิม ≥20 mmHg) 3.Massive bleeding รวมทั้ง sign of bleeding เช่น ถ่ายดำ จ้ำเลือด เลือดออกตามรูเข็ม ปัสสาวะเป็นเลือด 4. severe chest pain 5.อาการแพ้ยาที่รุนแรง ได้แก่ anaphylaxis (BP drops, bronchospasm, Urticaria) **ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอาการแพ้รุนแรง** - ให้หยุด streptokinase ทันที และให้ adrenaline 1:10000 จำนวน 1 ml IV นาน 5 min หากไม่ตอบสนองให้เพิ่มเป็น 2-5 ml IV 5 นาที

ผู้เตรียมยา..... ผู้ตรวจสอบ.....

ส่วนที่ 2 การติดตามการให้ยา

ว/ด/ป	เวลา	Monitoring			Nurse's note	ผู้บันทึก
		BP	HR	RR		

ว/ด/ป	เวลา	Monitoring			Nurse's note	ผู้บันทึก
		BP	HR	RR		