



โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน		
รหัสเอกสาร : P - PTC -	เริ่มใช้ : 10 พฤษภาคม 2562	แก้ไขครั้งที่ : -	จำนวนเนื้อหา : 3 หน้า

วิธีปฏิบัติ เรื่อง การจ่ายยาผู้ป่วยใน


ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติวรยุทธการ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ควบคุม ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพ่อง	<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ: P - PTC -	หน้า 1	ฉบับที่
เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน	ปรับปรุงครั้งที่ -	วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ


ผู้รับผิดชอบ : เภสัชกร 2 คน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 คน

เครื่องมือ / อุปกรณ์
แบบบันทึก PMP
แบบบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา
Doctor order sheet

วิธีปฏิบัติ

1. ผู้ป่วยกลับบ้าน

- 1.1 เภสัชกร ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำสั่งใช้ยา หากเกิดความคลาดเคลื่อนให้ปรึกษาแพทย์
 - ตรวจสอบชื่อยา ความแรง วิธีใช้ยา
 - ตรวจสอบขนาดยาที่แพทย์สั่งใช้
 - ตรวจสอบ Drug interaction ของยาที่แพทย์สั่งใช้
 - กรณีแพทย์สั่งใช้ยาที่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต ให้ดูค่า Lab ก่อนทุกครั้ง
- 1.2 เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา และยาที่จัด โดยเทียบกับ copy order : ถูกคน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา รวมถึงจำนวน-รายการยาครบถ้วน ถ้าพบความคลาดเคลื่อน แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก ความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นในใบสั่งยา
- 1.3 เภสัชกรเรียกชื่อผู้รับบริการ กล่าวทักทาย และให้ผู้รับบริการเอ่ยชื่อ-นามสกุลตนเอง ทวนชื่อ-นามสกุลผู้รับบริการอีกครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้รับบริการกับชื่อในฉลากยา

โรงพยาบาลปากพนัง	<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ: P – PTC –	หน้า 2	ฉบับที่
เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน	ปรับปรุงครั้งที่ -	วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

1.4 เภสัชกรจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำในการใช้ยา โดยใช้คำถามหลักในการส่งมอบยา

- มานอน ร.พ.ครั้งนี้ แพทย์บอกว่าเป็นอะไร
 - แพทย์ให้ยาอะไรกลับบ้านบ้าง
 - แพทย์บอกถึงผลหรือฤทธิ์ของยาว่าอย่างไร
 - ยานี้ใช้อย่างไร
 - ท่านเคยแพ้ยาอะไรหรือไม่
- ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้รับบริการควรได้รับทุกราย
- ชื่อ, ข้อบ่งใช้ของยา
 - วิธีใช้ยา
 - อาการข้างเคียงที่พบบ่อย และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 - ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้ยาดังกล่าว
 - การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยาดังกล่าว


2.ผู้ป่วยนอนในตึก (เขตรถยา)

2.1 เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำสั่งใช้ยา หากเกิดความคลาดเคลื่อนให้ปรึกษาแพทย์

- ตรวจสอบชื่อยา ความแรง วิธีใช้ยา
- ตรวจสอบขนาดยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบ Drug interaction ของยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบประวัติแพ้ยาผู้ป่วย
- กรณีแพทย์สั่งใช้ยาที่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต ให้ดูค่า Lab ก่อนทุกครั้ง

2.2 เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา และยาที่จัด โดยเทียบกับ copy order : ถูกคน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา รวมถึงจำนวน-รายการยาครบถ้วน ถ้าพบความคลาดเคลื่อน แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก ความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นในใบสั่งยา

2.3 เภสัชกรตรวจเขตรถยา ตรวจสอบจำนวนเตียงผู้ป่วยให้ครบก่อนส่งมอบรถยา

โรงพยาบาลปากพนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ: P – PTC –		หน้า 3	ฉบับที่
เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน		ปรับปรุงครั้งที่ -	วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

3.นอกเวลา (16.30 น. – 24.00 น.) และผู้ป่วยรับใหม่

3.1 เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำสั่งใช้ยา หากเกิดความคลาดเคลื่อนให้ปรึกษาแพทย์

- ตรวจสอบชื่อยา ความแรง วิธีใช้ยา
- ตรวจสอบขนาดยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบ Drug interaction ของยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบประวัติแพ้ยาผู้ป่วย
- กรณีแพทย์สั่งใช้ยาที่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต ให้ดูค่า Lab ก่อนทุกครั้ง

3.2 เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา และยาที่จัด โดยเทียบกับ copy order : ถูกคน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา รวมถึงจำนวน-รายการยาครบถ้วน ถ้าพบความคลาดเคลื่อน แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก ความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นในใบสั่งยา

3.3 เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่คัดลอกลงใน PMP

3.4 มีการตรวจสอบยาก่อนการจ่ายยาโดยอีกบุคคลหนึ่ง (จพ)

เกณฑ์การตรวจสอบ / ตัวชี้วัดมาตรฐาน

Dispensing error < 1 ครั้ง / 1000 วันนอน และระดับความรุนแรงไม่เกินระดับ D