

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพนัง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพนัง	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หัวข้อ: ขออนุมัตินำ ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการระบุน้หมดอายุของยาMultiple dose แก้ไขปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล รายละเอียดข้อมูล : ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการระบุน้หมดอายุของยาMultiple dose แก้ไขปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ) Link ภายนอก: :http:// www.pknhospital.com หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่  (นางสาวอภิรดี เบ้าวงศ์สกุล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	

โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง : การระบุวันหมดอายุของยา Multiple Dose		
รหัสเอกสาร : P – PTC – ๐๐๑	เริ่มใช้ : สกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	แก้ไขครั้งที่ : ๕	จำนวนเนื้อหา : ๕ หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การระบุวันหมดอายุของยา Multiple Dose

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติ วรรณการ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ :

เอกสารฉบับ ☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : การระบุนวันหมดอายุของยา Multiple Dose		ปรับปรุงครั้งที่ ๕	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง	

๑.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หน่วยเบิกทราบวันหมดอายุหลังเปิดใช้ของยา Multiple Dose อันจะป้องกันความเสี่ยงที่จะนำยา Multiple Dose ซึ่งอาจเสื่อมสภาพเมื่อเปิดใช้เป็นเวลานาน มาให้บริการผู้ป่วย

๒.เป้าหมาย

วิธีปฏิบัติเรื่องการระบุนวันหมดอายุของยา Multiple Dose ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกที่มียา Multiple Dose สำหรับให้บริการผู้ป่วย ได้แก่ งานบริการจ่ายยา งานผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งานห้องคลอด งานห้องผ่าตัด ฝ่ายทันตกรรม ดึกผู้ป่วยหญิง ดึกผู้ป่วยชาย หน่วยปฐมภูมิหลัก สถานบริการระดับรอง และหน่วยงานอื่นๆ

๓.คำจำกัดความ

ยา Multiple Dose หมายถึง ยาซึ่งมีหน่วยบรรจุหลายหน่วย และไม่สามารถใช้ได้หมดในครั้งเดียว

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยจ่าย

- เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ :


๑. ติดสติ๊กเกอร์สำหรับระบุนวันหมดอายุของยา Multiple Dose บนบรรจุภัณฑ์ของยา Multiple Dose ซึ่งหน่วยเบิกต่างๆ เบิก

หน่วยเบิก

- หัวหน้าหน่วยเบิก :

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของวันหมดอายุที่ระบุในสติ๊กเกอร์สำหรับระบุนวันหมดอายุของยา Multiple Dose ที่เปิดใช้

๒. ตรวจสอบและเฝ้าระวังการหมดอายุของยา Multiple Dose และกรณีที่พบว่าไม่สามารถใช้ได้ทันก่อนวันหมดอายุ จะต้องนำไปให้หน่วยบริการที่มีอัตราการใช้เร็วกว่าช่วยใช้ก่อน

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๒	ฉบับที่
เรื่อง : การระบุนวันหมดอายุของยา Multiple Dose		ปรับปรุงครั้งที่ ๕	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรรณการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง	

ผู้รับผิดชอบ (ต่อ)

-เจ้าหน้าที่หน่วยเบิก :

๑. ระบุนวันที่เปิดใช้ และวันหมดอายุของยา Multiple Dose ในสต็อกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์ ทุกครั้งที่เปิดใช้
๒. ตรวจสอบและเฝ้าระวังการหมดอายุของยา Multiple Dose

ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑. เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์ติดสติ๊กเกอร์สำหรับระบุนวันหมดอายุที่บรรจุภัณฑ์ของยา Multiple Dose ก่อนเบิกจ่ายให้หน่วยเบิก โดยจะต้องติดบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ แต่ต้องไม่ทับชื่อยา
๒. หน่วยเบิก เมื่อมีการเปิดใช้ยา Multiple Dose จะต้องระบุนวันที่เปิดใช้ และวันหมดอายุของยานับจากวันเปิดใช้ ลงบนสติ๊กเกอร์ ทุกครั้ง
๓. หน่วยเบิก เฝ้าระวังวันหมดอายุของยาที่เปิดใช้ ถ้าไม่สามารถใช้ได้ทันก่อนวันหมดอายุที่ระบุในสติ๊กเกอร์ จะต้องนำไปให้หน่วยบริการอื่นที่มีอัตราการใช้เร็วกว่าช่วยใช้ก่อน

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนรายการยา Multiple Dose ที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ = ๐ %
๒. จำนวนรายการยา Multiple Dose ที่เปิดใช้โดยไม่ได้ระบุนวันเปิดใช้-วันหมดอายุบนสติ๊กเกอร์ = ๐ %
๓. จำนวนรายการยา Multiple Dose ที่หมดอายุ ณ จุดให้บริการผู้ป่วย = ๐ %

การระบุนอายุของยา Multiple Dose หลังเปิดใช้

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๘ ชั่วโมง

๑. Rabies Vaccine
๒. Hep-B Vaccine

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
ระเบียบปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๓	ฉบับที่
เรื่อง : การระบุน้ำมันหอยของยา Multiple Dose		ปรับปรุงครั้งที่ ๕	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรรณการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง	

การระบุน้ำมันหอยของยา Multiple Dose หลังเปิดใช้

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๑ วัน

๑. ๐.๕% NSS ๑๐๐ ml
๒. ๐.๕% NSS for Irrigation ๑๐๐๐ ml
๓. Sterile Water for Injection ๑๐๐ ml
๔. Sterile Water for Irrigation ๑๐๐๐ ml

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๓ วัน

๑. Lidocain ๒% (ถ้าเก็บในตู้เย็น ๒-๘ องศา มีอายุ ๓ วัน)
- กรณี Lidocain ๒% ที่องค์การเภสัชกรรม GPO เป็นผู้ผลิต มีอายุ ๑ เดือน หลังเปิดใช้

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๗ วัน

๑. Thiopental (เก็บในตู้เย็น ๒-๘ องศา)

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๑ เดือน

๑. Chloramphenical Eye Ointment
๒. Chlortetracyclin Eye Ointment
๓. NPR insulin
๔. Mixtard insulin
๕. Regular insulin
๖. Povidone Iodine ๑๐%
๗. Alcohol ๗๐%
๘. AZT syrup

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๓ เดือน

๑. Antacid Gel
๒. M.Carminative

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
ระเบียบปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๔	ฉบับที่
เรื่อง : การระบุวันหมดอายุของยา Multiple Dose		ปรับปรุงครั้งที่ ๕	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง	

การระบุอายุของยา Multiple Dose หลังเปิดใช้

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๓ เดือน (ต่อ)

๓. Paracetamol syrup
๔. Nevirapine suspension

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๖ เดือน

๑. Lubricating gelly
๒. Aromatic ammonia
๓. Chloramphenical Ointment
๔. Chlorhexidine Scrub
๕. Hibitane Obstetric Cream
๖. Hydrogen peroxide
๗. Olive oil
๘. Povidone Iodine Scrub ๗.๕%
๙. Vasaline
๑๐. Silver sulfadiazine cr.
๑๑. Xylocain gelly
๑๒. Alcohol ๕๕%

ยาที่มีอายุหลังเปิดใช้ ๑ ปี

๑. ยาเม็ด

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม ☐ ไม่ควบคุม	
ระเบียบปฏิบัติ : P – PTC –		หน้า ๕	ฉบับที่
เรื่อง : การระบุนวันหมดอายุของยา Multiple Dose		ปรับปรุงครั้งที่ ๕	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรรณการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง	

Injection

ลำดับ	ชื่อยา	อายุยา (ปี)	ข้อมูลเพิ่มเติม
	สถานะการเก็บรักษา: อุณหภูมิไม่เกิน 25°C ทุกรายการ		
1	Adrenaline Injection 1 mg/ml	2	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 3 เดือน
2	Amikacin Sulfate Injection (250, 500 mg/2ml) vial	3	-
3	Ampicillin Injection 500 mg. vial	2.5	ใช้ภายใน 1 ชม. หลังละลาย อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
4	Ampicillin Injection 1 g. vial	2.5	ใช้ภายใน 1 ชม. หลังละลาย อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 6 เดือน
5	Atropine Sulfate Injection 0.6 mg/ml	2	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 6 เดือน
6	Calcium Gluconate Injection 10% w/v	4	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
7	Chlorpheniramine Injection 10 mg/ml	2	ป้องกันแสง อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
8	Chlorpromazine Injection 50mg/2ml	2	ป้องกันแสง อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
9	Cimetidine Injection 200 mg/2 ml	2	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
10	Cloxacillin Injection 1 g. vial	3	หลังละลาย อยู่ที่อุณหภูมิห้องได้ 2 ชม. หลังละลายเก็บในตู้เย็นได้ 24 ชม. อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 6 เดือน
11	Diazepam Injection 10 mg/2ml	3	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 6 เดือน
12	Dexamethasone Sodium Phosphate Injection 4 mg/ml	2.5	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 6 เดือน
13	Ephedrine Hydrochloride Injection 30 mg/ml	3	ป้องกันแสง อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
14	Furosemide Injection 20 mg/2 ml	3	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
15	Gentamicin Sulfate Injection 80 mg/2 ml	3	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
16	Hyoscine Butylbromide Injection 20 mg/ml	2	ป้องกันแสง อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 6 เดือน
17	Lidocaine Hydrochloride Injection 1%w/v 20,50ml vial	2.5	หลังเปิดใช้ 14 วัน Sterility ผ่าน อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
18	Lidocaine Hydrochloride Injection 2%w/v 20,50ml vial	2.5	หลังเปิดใช้ 14 วัน Sterility ผ่าน อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
19	Metoclopramide Hydrochloride Injection 10 mg/2 ml	3	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
20	Neostigmine Injection 2.5 mg/ml	2	ป้องกันแสง อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน
21	Quinine Dihydrochloride Injection 600 mg/2 ml	3	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 6 เดือน
22	Sodium Bicarbonate Injection 7.5 w/v 50ml vial	2	-
23	Terbutaline Sulfate Injection 0.30 mg/ml	3	อุณหภูมิ 40°C อยู่ได้ 1 เดือน