

โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย		
รหัสเอกสาร :	เริ่มใช้ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	แก้ไขครั้งที่ : ๒	จำนวนเนื้อหา : ๓ หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จาก
โรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย


	ผู้รับผิดชอบ	ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		
ทบทวนโดย	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ		


บันทึกการแก้ไข


ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก
๑	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	

สำเนาฉบับที่ :


เอกสารฉบับ ควบคุม ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพนัง	๑ ควบคุม ๑ ไม่ควบคุม	
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : P-PTC	หน้า 1	ฉบับที่
เรื่อง : การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย	ปรับปรุงครั้งที่ 2	วันที่ 1 ตุลาคม 2565
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง
<p>เรื่อง : การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 2. เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพซ้ำ <p>ขอบข่าย ผู้รับบริการที่รับบริการจากโรงพยาบาลปากพนังที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและมีที่อยู่ครอบคลุม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นๆ</p> <p>ความรับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เป็นผู้กำหนดนโยบาย ระบบและระเบียบปฏิบัติในการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแนวทางการส่งต่อข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 2. เภสัชกรเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การซักประวัติ ประเมินการแพ้ยา ให้คำแนะนำผู้ป่วย และการออกบัตรแพ้ยา และส่งต่อข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 3. เจ้าหน้าที่ IT ของโรงพยาบาล : ดึงข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังแล้วแยกที่อยู่ของผู้ป่วยในรายนั้นๆ ณ รพ.สต. ต่างๆ 4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังแล้วให้ลงประวัติผู้ป่วยที่แพ้ยาในโปรแกรม JHCIS และในกรณีที่มีเวชระเบียน ให้ติด Sticker แพ้ยาสีชมพู 		

โรงพยาบาลปากพนัง	๑ ความคุม ๑ ไม่ความคุม	
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : P-PTC	หน้า 2	ฉบับที่
เรื่อง : การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย	ปรับปรุงครั้งที่ 2	วันที่ 1 ตุลาคม 2565
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรรณการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง
ขั้นตอนการดำเนินงาน <ol style="list-style-type: none"> เภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน ADR รวบรวมข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังทั้งหมด ให้ฝ่าย IT โรงพยาบาลดึงข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังแล้วแยกที่อยู่ของผู้ป่วยในรายนั้น ๆ ณ รพ.สต. ต่าง ๆ เภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน ADR จัดทำ Sticker แพ้ยาเป็นสีชมพู แนบรายชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ ใน รพ.สต. นั้น ๆ พร้อมรายชื่อยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเครือข่าย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากโรงพยาบาลปากพนังแล้วให้ลงประวัติผู้ป่วยที่แพ้ยาใน โปรแกรม JHCIS และในกรณีที่มีเวชระเบียนให้ติด Sticker แพ้ยาสีชมพูพร้อมทั้งเขียนรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลผู้ป่วย : ชื่อ-นามสกุล อายุ และเบอร์โทรศัพท์ - รายชื่อยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ - อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 		

โรงพยาบาลปากพนัง	๑ ความคุม ๑ ไม่ความคุม	
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : P-PTC	หน้า 3	ฉบับที่
เรื่อง : การส่งต่อข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากโรงพยาบาลปากพนังสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย	ปรับปรุงครั้งที่ 2	วันที่ 1 ตุลาคม 2565
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรรณการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง

ผังการดำเนินงาน



มาตรฐานการ NOTE ใน JHCIS

1. ผู้ป่วยแพ้ยา

“ผู้ป่วยแพ้ยา..... ระดับ(ถ้ามี).....มีอาการ.....
ห้ามใช้ยา..... และหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม.....
ได้แก่ยา(ที่มีใน รพ.สต.นั้นๆ)”

ตัวอย่าง

“ผู้ป่วยแพ้ยา Amoxicillin ระดับ Probable มีอาการ หน้าบวม ตาบวม
ห้ามใช้ยา Amoxicillin และหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม Penicillin ได้แก่ Dicloxacillin ,
Pencillin V”

2. ผู้ป่วยที่ใช้ยาความเสี่ยงสูง “Warfarin”

“ผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs ได้แก่ (ยาที่มีใน
รพ.สต.นั้นๆ)..... , เกลว็ลยี่เปรียง, Metronidazole, Norfloxacin และหลีกเลี่ยงการใช้
ยาสมุนไพรทุกชนิด กรณีตรวจพบว่าตั้งครรภ์ หรือต้องทำหัตถการที่เสี่ยงต่อการเลือดออก เช่น ทำ
ฟัน ให้ส่งพบแพทย์”

ตัวอย่าง

“ผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs ได้แก่
Ibuprofen, Naproxen , เกลว็ลยี่เปรียง, Metronidazole, Norfloxacin และหลีกเลี่ยงการ
ใช้ยาสมุนไพรทุกชนิด กรณีตรวจพบว่าตั้งครรภ์ หรือต้องทำหัตถการที่เสี่ยงต่อการเลือดออก
เช่น ทำฟัน ให้ส่งพบแพทย์”

3. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป

“ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ..... (ระบุ 3-5) (eGFR= mL/min/1.73m²) (ระบุ eGFR ที่ตรวจครั้งล่าสุด
ของผู้ป่วย) ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs ได้แก่ (ยาที่มีใน รพ.สต.นั้นๆ)....., เกลว็ลยี่เปรียง”

ตัวอย่าง

“ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ 4 (eGFR =25 mL/min/1.73m²)

ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs ได้แก่ Ibuprofen, Naproxen, เกลว็ลยี่เปรียง”

หมายเหตุ

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 3 : eGFR 30-59 mL/min/1.73m²

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 4: eGFR 15-29 mL/min/1.73m²

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 5: eGFR < 15 mL/min/1.73m²

1. ยาAntibiotic	
ชื่อยาที่แพ้	กลุ่มยาที่Block
Amoxycillin	Amoxicillin cap 250 mg,Amoxicillin cap 500 mg,Amoxicillin dry syr 125 mg/5
Augmentin,Ceftriaxone	ml,Dicloxacillin 250 mg,Dicloxacillin 500 mg,Dicloxacilline sodium syr 62.5 mg/5 ml ,Penicillin V tab 250 mg,Penicillin V dry syr 125 mg/5 ml, Amoxicillin 875 mg/Clavulanic acid 125 mg tab,Amoxicillin+Potassium clavulanate (400+57 mg/5 ml) syr
Cephalexin	Cephalexin syrup 125 mg/5mlx60ml,Amoxicillin cap 250 mg,Amoxicillin cap 500 mg,Amoxicillin dry syr 125 mg/5 ml,Dicloxacillin 250 mg,Dicloxacillin 500 mg,Dicloxacilline sodium syr 62.5 mg/5 ml ,Penicillin V tab 250 mg,Penicillin V dry syr 125 mg/5 ml Amoxicillin 875 mg/Clavulanic acid 125 mg tab,Amoxicillin+Potassium clavulanate (400+57 mg/5 ml) sy
Dicloxacillin	Amoxicillin cap 250 mg,Amoxicillin cap 500 mg,Amoxicillin dry syr 125 mg/5 ml,Dicloxacillin 250 mg,Dicloxacillin 500 mg,Dicloxacilline sodium syr 62.5 mg/5 ml ,Penicillin V tab 250 mg,Penicillin V dry syr 125 mg/5 ml ,Amoxicillin 875 mg/Clavulanic acid 125 mg tab,Amoxicillin+Potassium clavulanate (400+57 mg/5 ml) syr
Doxycycline	Doxycycline HCl cap 100 mg,tetracycline
Tetracycline	
Erythromycin	Erythromycin estolate dry syr 125 mg/5 ml
Norfloxacin,Ciprofloxacin,Levofloxacin	Norfloxacin tab 400 mg

2. ยากันชัก	
ชื่อยาที่แพ้	กลุ่มยาที่Block
carbamazepine	Phenobarbital tab 30 mg ,Phenobarbital tab 60 mg ,Phenytoin sodium extend release cap 100 mg (Dilantin)
Phenytoin	
Phenobarbital	

3. ยาNSAID	
ชื่อยาที่แพ้	กลุ่มยาที่Block
Ibuprofen	Ibuprofen syr 100 mg/5 ml,Ibuprofen tab 200 mg ,Ibuprofen tab 400 mg ,Naproxen tab 250 mg,Aspirin
Naproxen	
diclofenac	
Piroxicam	
indomethacin	
Mefenamic acid (Ponstan)	
Ketoprofen	
Celecoxib	
Etoricoxib	
Meloxicam	
Parecoxib	

4. ยาSulfa	
ชื่อยาที่แพ้	กลุ่มยาที่Block
Co-trimoxazole (SMZ/TMP) tab 400/80 mg (Bactrim)	Co-trimoxazole (SMZ/TMP) tab 400/80 mg ,Co-trimoxazole(SMZ/TMP) susp 200/40 mg/5 ml, Silver sulfadiazine cream 1%
sulfadiazine	
ยาซัลฟา	
Silver sulfadiazine cream 1%	

ยาAntibiotic	
ชื่อยาที่แพ้	กลุ่มยาที่Block
Penicillin V	Amoxicillin cap 250 mg,Amoxicillin cap 500 mg,Amoxicillin dry syr 125 mg/5 ml,Dicloxacillin 250 mg,Dicloxacillin 500 mg,Dicloxacilline sodium syr 62.5 mg/5 ml ,Penicillin V tab 250 mg,Penicillin V dry syr 125 mg/5 ml, Amoxicillin 875 mg/Clavulanic acid 125 mg tab,Amoxicillin+Potassium clavulanate (400+57 mg/5 ml) syr
Roxithromycin	Roxithromycin tab 150 mg
Clindamycin	Clindamycin cap 300 mg

5. ยาอื่นๆ	
ชื่อยาที่แพ้	กลุ่มยาที่Block
Paracetamol	Paracetamol syr 120 mg/5 ml (60 ml), Paracetamol
Paracetamol+Orphenadine	tab 325 mg, Paracetamol tab 500 mg
Simvastatin	Simvastatin
Clotrimazole	Clotrimazole vg tab 200 mg, Clotrimazole Cream
Allopurinol	Allopurinol tab 100 mg
Iohexol	Note ในJHCIS อย่างเดียว
Atorvastatin	Note ในJHCIS อย่างเดียว
Amlodipine	Amlodipine 5 mg, Amlodipine 10 mg
Enalapril	Enalapril tab 5 mg, Enalapril tab 20 mg
Lidocaine	Lidocaine HCl inj 2% (50 ml)

6. ยาที่เกิดDrug interaction	
ชื่อยาที่ผู้ป่วยใช้	กลุ่มยาที่Block
Simvastatin	Ketoconazole/Itraconazole /Gemfibrozil
Ketoconazole	Simvastatin/Itraconazole /Gemfibrozil/Ergotamine(Carfergot)
Itraconazole	Simvastatin/Ketoconazole /Gemfibrozil/Ergotamine(Cafergot)
Gemfibrozil	Simvastatin /Ketoconazole/Itraconazole
Thioridazine	Propranolol
Ergotamine	Ketoconazole/Itraconazole
Enalapril	Losartan
Warfarin	เถาวัลย์เปรียง, Metronidazole, Norfloxacin ,Ibuprofen syr 100 mg/5 ml, Ibuprofen tab 200 mg ,Ibuprofen tab 400 mg ,Naproxen tab 250 mg, Aspirin /ยาธรณีสังกะษิต/ยาหอมเทพจิตร์/ยาบำรุงโลหิต/ยาขมื่นชั้น /เจลพริก/ยาธาตุดรรจบ/ยาหอมนวโกฐ/ยาฟ้าทะลายโจร
ไต่วายเรื้อรัง ระดับ 3 ขึ้นไป	Ibuprofen syr 100 mg/5 ml,Ibuprofen tab 200 mg ,Ibuprofen tab 400 mg ,Naproxen tab 250 mg ,Aspirin,เถาวัลย์เปรียง
aspirin	ยาธรณีสังกะษิต/ยาหอมเทพจิตร์/ยาบำรุงโลหิต/ยาขมื่นชั้น/เจลพริก /ยาธาตุดรรจบ/ยาหอมนวโกฐ/ยาฟ้าทะลายโจร
propranolol	ยาธรณีสังกะษิต/ยาสหัสธารา/ยาขมื่นชั้น
phenytoin	
theophylline	ยาธรณีสังกะษิต/ยาสหัสธารา /ยาฟ้าทะลายโจร/ยาขมื่นชั้น
Ibuprofen	ยาเถาวัลย์เปรียง
naproxen	

ยาสมุนไพรร	
ยาธรณีสังกะฆาต	aspirin,warfarin
ยาหอมเทพจิตร	
ยาบำรุงโลหิต	
ยาขมื่นชัน	
เจลพริก	
ยาธาตุนครจวบ	
ยาหอมนวโกฐ	
ยาธรณีสังกะฆาต	phenytoin, propranolol, theophylline
ยาสหัสธารา	
ยาฟ้าทะลายโจร	warfarin, theophylline, aspirin
ยารางจืด	insulin, metformin, glipizide
ยาขมื่นชัน	propranolol, theophylline, phenytoin
ยาเถาวัลย์เปรียง	Ibuprofen syr 100 mg/5 ml, Ibuprofen tab 200 mg ,Ibuprofen tab 400 mg ,Naproxen tab 250 mg, Aspirin