

โรงพยาบาลปักษ์นั่ง



กระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลปักษ์นั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ใช้ยา Warfarin จากโรงพยาบาลปักษ์นั่งไปยังสถานบริการปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพอำเภอปักษ์นั่ง		
รหัสเอกสาร : P – PTC –	เริ่มใช้ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	แก้ไขครั้งที่ : ๕	จำนวนเนื้อหา : ๓ หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการส่งมอบยา เครื่อข่ายสุขภาพอำเภอปักษ์นั่ง

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ทบทวนโดย	คณะกรรมการ PTC เครือข่าย		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปักษ์นั่ง		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก
๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔
๒	๑ เมษายน ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕
๔	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	

สำเนาฉบับที่ : .....

เอกสารฉบับนี้  ควบคุม  ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปักษ์นััง	ω ควบคุม	ω ไม่ควบคุม
ระเบียนปฏิบัติเลขที่ :	หน้า 1	ฉบับที่
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใช้ยา Warfarin จากโรงพยาบาลปักษ์นัังไปยังสถานบริการปฐมภูมิในเครือข่ายปักษ์นััง	ปรับปรุงครั้งที่ ๕	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ : (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปักษ์นััง

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใช้ยา Warfarin จากโรงพยาบาลปักษ์นัังไปยังสถานบริการปฐมภูมิในเครือข่ายปักษ์นััง

**วัตถุประสงค์ :** การจัดการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin ที่มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความปลอดภัย เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายปักษ์นัังให้บรรลุเป้าหมายในการรักษา

ผู้รับผิดชอบ : เภสัชกร

#### ขั้นตอนการดำเนินงาน :

- Programmer ของ รพ. ดึงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ในแต่ละเขตตำบลต่างๆ เพื่อเตรียมเอกสารแบบส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยา Warfarin ในโรงพยาบาล

- เภสัชกรประจำโรงพยาบาลให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ เรื่องการปฏิบัติตัวในการใช้ยา Warfarin และให้พกสมุดติดตัวทุกครั้ง ก่อนส่งต่อไปยัง รพ.สต.

- เภสัชกรที่รับผิดชอบในแต่ละเขต รพ.สต. ของตนเองและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้จัดทำทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ยา Warfarin ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกับผู้ป่วยแพ้ยา

- ให้แต่ละ รพ.สต. ติดสติ๊กเกอร์สีเข้ม “ Warfarin ” บน family folder/ OPD Card ของผู้ป่วยแต่ละรายที่มีการใช้ยา warfarin เพื่อจำแนกผู้ป่วย และเฝ้าระวังการใช้ยาให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม

- ลงระบบ Pop up alert ในระบบ Hos-xp ทุก รพ.สต. ว่าผู้ป่วยใช้ยา warfarin

#### มาตรฐานการ NOTE ใน JHCIS ดังนี้

“ผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ห้ามใช้ยาคู่ NSAIDs ได้แก่ Ibuprofen, Aspirin, เดวาลัยเบริง, Metronidazole, และหลีกเลี่ยงการใช้ยาสามัญไฟรทุกชนิด เช่น ยาหومเพฟิตร/ยาบาร์ส โลหิต/ยาเม็นชัน/ เจลพริก/ชาตุบรรจบ/ยาหومนวโคส/ยาฟ้าทะลายโจร กรณีตรวจพบว่าตั้งครรภ์ หรือต้องทำหัตถการที่เสี่ยงต่อการเลือดออก เช่น ทำ พัน ให้ส่งพนแพทย์”

โรงพยาบาลปากพนัง	ด้วยความคุณ	ด้วยไม่ความคุณ
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ :	หน้า 1	ฉบับที่
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใช้ยา Warfarin จากโรงพยาบาลปากพนังไปยังสถานบริการปฐมภูมิในเครือข่ายปากพนัง	ปรับปรุงครั้งที่ ๕	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง :	
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ผู้ทบทวน : คณะกรรมการ PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพนัง



- เพื่อเฝ้าระวัง และหลีกเลี่ยงการจ่ายยาอื่นๆ ที่มีผล Drug Interaction กับยา Warfarin
- เพื่อเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยา Warfarin ที่รุนแรง เช่น Bleeding หรือ ปวดศรีษะรุนแรง



- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังการเกิด ADE ในผู้ป่วยที่รับประทานยา Warfarin แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยกลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลประจำ รพ.สต.



- ถ้าพบการใช้ยาที่ไม่ลูกต้องเหมาะสม หรือเกิด ADE ที่รุนแรงขึ้นกับผู้ป่วย จากการใช้ยา Warfarin ให้ รพ.สต. ดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยกลับมารักษาอย่างโรงพยาบาลในทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

## แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ JHCIS สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin

“ ผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ห้ามใช้ยาแก้ปวด NSAIDs ได้แก่ Diclofenac Ibuprofen เกาวัลย์เบรีย Metronidazole Norfloxacin (รายการยาที่มีใน รพ.สต.) และหลีกเลี่ยงการใช้ยาสมุนไพรทุกชนิด กรณีตรวจพบว่าตั้งครรภ์ หรือต้องทำการท้าทการที่เสี่ยงต่อการเลือดออก เช่น ทำฟัน ให้ส่งพบแพทย์”

หมายเหตุ ให้ตั้งลอกรายการยาตามรายการดังกล่าว เน้นข้อ รายการยาสมุนไพรต้องลอกรายการที่มีในบัญชียา รพ.สต.