

โรงพยาบาลปากพนัง





กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบปฏิบัติ	เรื่อง : แนวทางการจัดการยา Multiple Dose เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง		
รหัสเอกสาร : P - PTC -	เริ่มใช้ : ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	แก้ไขครั้งที่ : ๒	จำนวนเนื้อหา : ๔ หน้า

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการจัดการยา Multiple Dose  
เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง

ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ทบทวนโดย	คณะกรรมการ PTC เครือข่าย		
อนุมัติโดย	นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก
๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒	๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	

สำเนาฉบับที่ : .....

เอกสารฉบับ  ควบคุม  ไม่ควบคุม

เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง	๑ ควบคุม	๑ ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ :	หน้า ๑	ฉบับที่ ๑
เรื่อง : แนวทางการจัดการยา Multiple Dose เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง	ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง : พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	
ผู้จัดทำ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่าย	ผู้ทบทวน : PTC	ผู้อนุมัติ : (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

เรื่อง แนวทางการจัดการยา Multiple Dose เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง

คำจำกัดความ

ยา Multiple Dose หมายถึง เภสัชภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้มากกว่า ๑ ครั้ง และสามารถเก็บไว้ใช้ได้โดยยังมีประสิทธิภาพอยู่

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ยา Multiple Dose หรือเภสัชภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้มากกว่า ๑ ครั้ง สามารถเก็บไว้ใช้ได้โดยยังมีประสิทธิภาพ หลังจากเปิดใช้ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

ขอบข่าย :


ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดการยา Multiple Dose เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง

ผู้รับผิดชอบ

- พยาบาลวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยบริการปฐมภูมิ
- เภสัชกรผู้รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด

- ความคลาดเคลื่อนจากการระบุวันหมดอายุในยา Multiple Dose เท่ากับ ๐

เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง	Ω ควบคุม	Ω ไม่ควบคุม
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ :	หน้า ๒	ฉบับที่ ๑
เรื่อง : แนวทางการจัดการยา Multiple Dose เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง	ปรับปรุงครั้งที่ ๒	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
แผนก : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	แผนกที่เกี่ยวข้อง : พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	
ผู้จัดทำ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่าย	ผู้ทบทวน : PTC	ผู้อนุมัติ :  (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง

### แนวทางปฏิบัติสำหรับยา Multiple Dose

๑. ล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสขวดยา
๒. ตรวจสอบยามีการเก็บในสถานะที่ถูกต้อง เช่น ป้องกันแสง หรือเก็บในตู้เย็น หากยามีการเปิดใช้แล้วให้ดูด้วยว่ามีกระบวนวันที่เปิดใช้ สภาพของจุกยางที่ปิดยังสมบูรณ์อยู่ ไม่มีการปนเปื้อน หรือสีไม่เปลี่ยนแปลง
๓. ใช้ aseptic technique ในการนำยาออกจากขวด โดยใช้ alcohol เช็ดจุกยางก่อนแทงเข็มทุกครั้ง
๔. หลีกจากใช้แล้ว ให้เก็บยาตามสถานะที่กำหนด หากเปิดใช้ครั้งแรกให้ระบุวันที่เปิดใช้ ให้มีการติดฉลากแสดงรายละเอียดการเปิดใช้ยา และวันหมดอายุของยา ดังภาพ

ชื่อยา.....
วันที่เปิดใช้.....เวลา.....
วันที่หมดอายุ.....เวลา.....
ชื่อผู้เปิด.....
ระบุเวลากรณีที่ยาหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง

การจัดเก็บยาหลังจากเปิดใช้แล้ว และการกำหนดวันหมดอายุของยา หน่วยบริการปฐมภูมิ สามารถกำหนดจากแนวทางการใช้ยา Multiple Dose ระบบยาหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัด นครศรีธรรมราช ดังตารางต่อไปนี้

ชื่อยา	สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับยาที่ยังไม่เปิดใช้	สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับยาที่เปิดใช้แล้ว	วันหมดอายุภายหลังจากเปิดใช้ยาครั้งแรก	หมายเหตุ
Lidocaine ๒ % injection (Lidocaine HCL -องค์การเภสัชกรรม)	T ≤ ๒๕ °C	ตู้เย็น (๒-๘ °C)	๑ เดือน	สังเกตการเกิดตะกอนและความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนการบริหารยา
Lidocaine ๒ % injection (DROCAINIL-A -บริษัท M&H)	T < ๓๐ °C	ตู้เย็น (๒-๘ °C)	๗ วัน	-ใส่ซองกันแสง -สังเกตการเกิดตะกอนและความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนการบริหารยา
Aromatic Ammonia ขนาด ๖๐ ml	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๖ เดือน	
NSS for irrigation	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๒๔ ชั่วโมง	
Sterile Water for irrigation	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๒๔ ชั่วโมง	
	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๑ เดือน	
๔% Chlorhexidine scrub (ในภาชนะเดิมหลังเปิดใช้) *กรณีมีการเปลี่ยนแปลงภาชนะดูตามหมายเหตุ	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๖ เดือน	ภาชนะแบ่งบรรจุให้เปลี่ยนทุก ๗ วัน โดยล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้ง ก่อนนำมาบรรจุน้ำยา
Povidone Iodine solution ขนาด ๑๕ ml	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๑ เดือน	
Silver sulfadiazine cream	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๑ เดือน	
Alcohol Hand rub ล้างมือ (ในภาชนะเดิมหลังเปิดใช้)	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๖ เดือน	ภาชนะแบ่งบรรจุให้เปลี่ยนทุก ๗ วัน โดยล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้ง ก่อนนำมาบรรจุน้ำยา
สบู่เหลวสำหรับล้างมือ (ในภาชนะเดิมหลังเปิดใช้)	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๖ เดือน	ภาชนะแบ่งบรรจุให้เปลี่ยนทุก ๗ วัน โดยล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้ง ก่อนนำมาบรรจุน้ำยา
ยาเม็ดแบ่งบรรจุ (กระปุก)	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	๑ ปี	นับจากวันแบ่งบรรจุ
ยาเม็ด ไม่แบ่งบรรจุ (ภาชนะเดิม)	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง	ตามอายุจริงที่ระบุข้างขวด	

