

โรงพยาบาลปากพนัง		☐ ควบคุม	☐ ไม่ควบคุม
แนวทางการดูแลรักษาเลขที่: CPG-MED- ๐๐๑		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : แนวทางการรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำจากยาเบาหวาน		ปรับปรุงครั้งที่ ๖	วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แผนก : อายุรกรรมทั่วไป		แผนกที่เกี่ยวข้อง : ER , Ward , คลินิกเรื้อรัง , รพ.สต และ กลุ่มงานเวชศาสตร์และชุมชน	
ผู้จัดทำ : แพทย์หญิง กมลวรรณ แซ่อึ้ง	ผู้ทบทวน : องค์กรแพทย์	ผู้อนุมัติ: (นายธรรมสถิตย์ พิบูลย์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง	

การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด

เกณฑ์วินิจฉัย

อาศัยเกณฑ์ ๓ ประการ ร่วมกัน (Whippletriad) ได้แก่

๑.ระดับพลาสมากลูโคสที่ ≤ 70 มก./ดล.

๒. มีอาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด

๓.และอาการหายไปเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

ในผู้ป่วยเบาหวานที่รับไว้ในโรงพยาบาล การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดใช้เกณฑ์ที่ ≤ 70 มก./ดล. เช่นกัน

