



# การลงข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(CKD) ในโปรแกรม JHCIS


เข้าสู่ผู้ป่วยที่ต้องการลงข้อมูล






คลิก "คำวินิจฉัย-จ่ายยา-เวชภัณฑ์"



หน้าจอ "คำวินิจฉัย-จ่ายยา-เวชภัณฑ์" คลิก "แพ้ยา"



ลงข้อมูลยา



- ยาที่ผู้ป่วยแพ้ ระบุ ชื่อสารัญญา

- วันที่ ที่บันทึก

- ประเภทการวินิจฉัย ระบุ "certain"

- ระดับความรุนแรง ระบุ "3 : ร้ายแรง"


- ลักษณะการแพ้ยา ระบุ "37 : Analgesic nephropatic"

- ประเภทผู้ให้ข้อมูล -กรณีข้อมูลจาก รพ.ปากพัง ระบุ "รพ.อื่นให้ข้อมูล" ถ้ารพ.สต.พบ.เองแล้วส่งให้รพ.ปากพังประเมินแล้ว ระบุ "รพ.นี้ให้ข้อมูล"


- สถานบริการ รพ.ปากพัง ระบุ "11333"



ระบุรายการยาอื่นที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (รายละเอียดในหมายเหตุ) โดยลงข้อมูลรายตัวยาจนครบ



ออกสูญหัวใจรวม คลิก "คำเตือนสุขภาพ" แล้ว  
ระบุข้อความคำเตือน(รายละเอียดในหมายเหตุ)



## หมายเหตุ

### มาตรฐานการ NOTE ใน JHCIS

#### 1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป

- ต้องล็อกการใช้ของยา รายการต่อไปนี้

Ibuprofen 400 mg

metfomin 500 mg, METFORMIN 850 MG [ CKD Stage 4-5 ]

enalapril 5 mg, ENALAPRIL 20 MG [ CKD Stage 4-5 ]

เคลวัลย์เปรียง

ฟ้าทะลายโจร

- ระบุข้อความ ใน “คำเตือนสุขภาพ”

“ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ..... (ระบุ 3-5) (eGFR= ..... ml/min/1.73m<sup>2</sup>) (ระบุ eGFR ที่ตรวจรังล่าสุดของผู้ป่วย) ห้ามใช้ยา ได้แก่ Ibuprofen, Metformin [ CKD Stage 4-5 ] Enalapril [ CKD Stage 4-5 ] เคลวัลย์เปรียง และฟ้าทะลายโจร”

#### ตัวอย่าง

“ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ 4 (eGFR =25 ml/min/1.73m<sup>2</sup>)

ห้ามใช้ยา ได้แก่ Ibuprofen 400 mg metfomin 500 mg METFORMIN 850 MG [ CKD Stage 4-5 ] enalapril 5 mg ENALAPRIL 20 MG [ CKD Stage 4-5 ] เคลวัลย์เปรียง และฟ้าทะลายโจร”

#### หมายเหตุ

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 3 : eGFR 30-59 ml/min/1.73m<sup>2</sup>

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 4: eGFR 15-29 ml/min/1.73m<sup>2</sup>

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 5: eGFR < 15 ml/min/1.73m<sup>2</sup>