




แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพ่อง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพ่อง	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
วัน/เดือน/ปี มกราคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ: ขออนุมัตินำ วิธีปฏิบัติการเตรียม Adrenaline Prefill บัญชียากันสงและการเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บัญชี คู่ยา อันตรกิริยาระหว่างยา โรงพยาบาลปากพ่อง และเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพ่อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาล	
รายละเอียดข้อมูล : วิธีปฏิบัติการเตรียม Adrenaline Prefill บัญชียากันสงและการเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง บัญชี คู่ยา อันตรกิริยาระหว่างยา โรงพยาบาลปากพ่อง และเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพ่อง (ตามเอกสารแนบ)	
Link ภายนอก: :http:// www.pknhospital.com	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศรีสุตา ศิลาโชติ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมเกียรติ วรยุทธการ) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่  (นางสาวอภิรตี เบ้าวงศ์สกุล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

บัญชีคู่ยา อันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction)

เครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2564

รายการยาที่ 1	รายการยาที่ 2	รายละเอียดอันตรกิริยาระหว่างยา และผลที่เกิดขึ้น (Effect & Management)	แนวทางการจัดการ/แก้ไข
Simvastatin	Gemfibrozil	ระดับยา simvastatin สูงขึ้นจนอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบแบบรุนแรง (Rhabdomyolysis)	ห้ามสั่งใช้ร่วมกัน
Enalapril	Losartan	หากใช้ร่วมกันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด hyperkalemia hypotension และภาวะไตทำงานลดลงได้มากกว่าการใช้ยาเดี่ยว	ห้ามสั่งใช้ร่วมกัน
Ferrous Triferdine	Norfloxacine	ลดการดูดซึมยา	รับประทานห่างกันอย่างน้อย 1 ชม. เช่น รับประทาน norfloxacine ก่อนอาหาร 1 ชม. รับประทาน ferrous หลังอาหาร หรือรับประทาน triferdine ก่อนนอน
Ferrous Triferdine	Doxycycline	ลดการดูดซึมยา	รับประทานห่างกันอย่างน้อย 3-4 ชม. ถ้าไม่มีภาวะซีดรุนแรง ควรหยุด ferrousชั่วคราว ช่วงรับประทาน doxycycline
Ferrous Triferdine	Calcium tab	Calcium ลดการละลายของธาตุเหล็ก	รับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชม.
Calcium tab	Norfloxacine	ลดการดูดซึมยา	รับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชม.
Calcium tab	*Ofloxacin *Ciprofloxacin	ลดการดูดซึมยา	ห้ามให้ร่วมกัน
Antacid suspension	Ferrous Triferdine	ลดการละลายของธาตุเหล็ก	รับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชม.
Antacid suspension	Norfloxacine	ลดการดูดซึมยา	รับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชม. เช่น รับประทาน norfloxacine ก่อนอาหาร 1 ชม. หรือเปลี่ยน ยาลดกรดเป็นตัวอื่น
Antacid suspension	*Ofloxacin *Ciprofloxacin	ลดการดูดซึมยา	ห้ามให้ร่วมกัน ให้เปลี่ยนยาลดกรดเป็นตัวอื่น
Antacid suspension	Doxycycline	ลดการดูดซึมยา	รับประทานห่างกันอย่างน้อย 3-4 ชม. ควรเปลี่ยนยาลดกรดเป็นตัวอื่น

* Ofloxacin *Ciprofloxacin อาจเป็นยาเดิมคนไข้จากที่อื่น