

การลงข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(CKD) ในโปรแกรม JHCIS

เข้าชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลงข้อมูล



คลิก "คำวินิจฉัย-จ่ายยา-เวชภัณฑ์"






หน้าจอ "คำวินิจฉัย-จ่ายยา-เวชภัณฑ์" คลิก "แพทย์"



ลงข้อมูลยา


- 1 • ยาที่ผู้ป่วยแพ้ ระบุ ชื่อสามัญทางยา
- 2 • วันที่ ที่บันทึก
- 3 • ประเภทการวินิจฉัย ระบุ "certain"
- 4 • ระดับความรุนแรง ระบุ "3 : ร้ายแรง"
- 5 • ลักษณะการแพ้ยา ระบุ "37 : Analgesic nephropatic"
- 6 • ประเภทผู้ให้ข้อมูล -กรณีข้อมูลจาก รพ.ปากพอง ระบุ "รพ.อื่นให้ข้อมูล" ถ้ารพ.สต.พบเองแล้วส่งให้รพ.ปากพองประเมินแล้ว ระบุ "รพ.นี้ให้ข้อมูล"
- 7 • สถานบริการ รพ.ปากพอง ระบุ "11333"



ระบุรายการยาอื่นที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (รายละเอียดในหมายเหตุ) โดยลงข้อมูลรายตัวยาจนครบ



ออกสู่หน้าจอรวม คลิก "คำเตือนสุขภาพ" แล้วระบุข้อความคำเตือน(รายละเอียดในหมายเหตุ)



หมายเหตุ

มาตรฐานการ NOTE ใน JHCIS

1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป

- ต้องถือการใช้ของยา รายการต่อไปนี้

Ibuprofen 400 mg

metfomin 500 mg, METFORMIN 850 MG [CKD Stage 4-5]

enalapril 5 mg, ENALAPRIL 20 MG [CKD Stage 4-5]

เถาวัลย์เปรียง

ฟ้าทะลายโจร

- ระบุข้อความ ใน “คำเตือนสุขภาพ”

“ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ..... (ระบุ 3-5) (eGFR= ml/min/1.73m²) (ระบุ eGFR ที่ตรวจครั้งล่าสุดของผู้ป่วย) ห้ามใช้ยา ได้แก่ Ibuprofen, Metformin [CKD Stage 4-5] Enalapril [CKD Stage 4-5] เถาวัลย์เปรียง และฟ้าทะลายโจร”

ตัวอย่าง

“ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระดับ 4 (eGFR =25 ml/min/1.73m²)

ห้ามใช้ยา ได้แก่ Ibuprofen 400 mg metfomin 500 mg METFORMIN 850 MG [

CKD Stage 4-5] enalapril 5 mg ENALAPRIL 20 MG [CKD Stage 4-5] เถาวัลย์เปรียง

และฟ้าทะลายโจร”

หมายเหตุ

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 3 : eGFR 30-59 ml/min/1.73m²

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 4: eGFR 15-29 ml/min/1.73m²

ไตวายเรื้อรัง ระดับ 5: eGFR < 15 ml/min/1.73m²

