



การลงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ในโปรแกรม JHCIS


เข้าชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลงข้อมูล



คลิก "คำวินิจฉัย-จ่ายยา-เวชภัณฑ์"






หน้าจอ "คำวินิจฉัย-จ่ายยา-เวชภัณฑ์" คลิก "แพทย์"



ลงข้อมูลยา

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7


- ยาที่ผู้ป่วยแพ้ ระบุ ชื่อสามัญทางยา
- วันที่ ที่บันทึก
- ประเภทการวินิจฉัย ระบุ "certain"
- ระดับความรุนแรง ระบุ "3 : ร้ายแรง"
- ลักษณะการแพ้ยา ระบุ "06 : Haemorrhagic disorder"
- ประเภทผู้ให้ข้อมูล -กรณีข้อมูลจาก รพ.ปากพ่อง ระบุ "รพ.อื่นให้ข้อมูล" ถ้ารพ.สต.พบเองแล้วส่งให้รพ.ปากพ่องประเมินแล้ว ระบุ "รพ.นี้ให้ข้อมูล"
- สถานบริการ รพ.ปากพ่อง ระบุ "11333"



ระบุรายการยาอื่นที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยดังกล่าว (รายละเอียดในหมายเหตุ) โดยลงข้อมูลรายตัวจนครบ



ออกสู่นำจอรรวม คลิก "คำเตือนสุขภาพ" แล้วระบุข้อความคำเตือน(รายละเอียดในหมายเหตุ)



หมายเหตุ

มาตรฐานการ NOTE ใน JHCIS

1. ผู้ป่วยที่ใช้ยาความเสี่ยงสูง “Warfarin”

- ต้องถือการใช้ยา รายการต่อไปนี้

Aspirin

paracetamol 325 mg, PARACETAMOL 500 MG, Paracetamol syr.(ใช้ได้ไม่เกิน 2000 mg/สัปดาห์)

Co-Trimoxazole tab., Co-Trimoxazole suspension

Erythromycin syr.

dicloxacillin 250 mg, DICLOXACILLIN 500 MG, Dicloxacillin syr.

Simvastatin

Gemfibrozil

ยาเม็ดคุมกำเนิด

L-Thyroxin

PTU

ฟ้าทะลายโจร

ยาแก้ไอมะขามป้อม

ขมิ้นชัน

ยาเหลืองปิดสมุทร

เถาวัลย์เปรียง

- ระบุข้อความ ใน “คำเตือนสุขภาพ”

“ผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ห้ามใช้ยากลุ่ม NSAIDs ได้แก่ Ibuprofen, Aspirin, Co-Trimoxazole, Erythromycin, Dicloxacillin, Simvastatin, Gemfibrozil, ยาเม็ดคุมกำเนิด, L-Thyroxin, PTU, ฟ้าทะลายโจร, ยาแก้ไอมะขามป้อม, ขมิ้นชัน, ยาเหลืองปิดสมุทร, เถาวัลย์เปรียง, Paracetamol (ใช้ได้ไม่เกิน 2000 mg/สัปดาห์) และหลีกเลี่ยงการใช้ยาสมุนไพรทุกชนิด กรณีตรวจพบว่าตั้งครรภ์ หรือต้องทำหัตถการที่เสี่ยงต่อการเลือดออก เช่น ทำฟัน ให้ส่งพบแพทย์”