




แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลปากพนัง

| | |
|---|---|
| <p>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลปากพนัง</p> | |
| <p>ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปี มกราคม ๒๕๖๔ หัวข้อ: ขออนุมัตินำ ระเบียบปฏิบัติ การจัดการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านระบบยา บัญชียาและเวชภัณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง ตามศักยภาพผู้สูงอายุ การคำนวณขนาดยาในเด็ก เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล รายละเอียดข้อมูล : ระเบียบปฏิบัติ การจัดการยาช่วยชีวิตฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านระบบยา บัญชียาและเวชภัณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง ตามศักยภาพผู้สูงอายุ การคำนวณขนาดยาในเด็ก เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง (ตามเอกสารแนบ)</p> <p>Link ภายนอก: :http:// www.pknhospital.com</p> <p>หมายเหตุ:</p> | |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศรีสุดา ศิลาโชติ) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> | <p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมเกียรติ วรรณการ) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่  (นางสาวอภิรตี เบ้าวงศ์สกุล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> | |

การคำนวณขนาดยาในเด็ก
 เครื่องช่วยสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปี 2564

| ลำดับ | ชื่อยา | ขนาดยา | ความถี่ การบริหารยา | ระยะเวลา | ขนาดการใช้ยา (ml/dose) | | | |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------|----------|---------|
| | | | | | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| 1 | Amoxicillin Dry Syrup 125 mg/ 5 ml (60 ml/ขวด) | Pharyngitis, Tonsillitis : 25 MKDose | วันละ 2 ครั้ง | 10 วัน | 5 | 10 | 15 | 20 |
| | | Sinusitis : 45MKDay | ทุก 12 ชั่วโมง | 7-10 วัน | 9 | 18 | 27 | 36 |
| | | Acute otitis media : 80-90 MKDay | แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง | < 2 ปี = 10 วัน 2-5 ปี = 7 วัน 6-12 ปี = 5-7 วัน | 8-9 | 16-18 | 24-27 | 32-36 |
| 2 | Ammonium Carb Ammonium Carbonate 20 mg/5 ml + Glycerhiza 250 mc/5 ml (60 ml) | | วันละ 3-4 ครั้ง | | อายุ 1-2 ปี : 2.5 ml | | | |
| | | | | | อายุ 3-5 ปี : 5 ml | | | |
| | | | | | อายุ 6-12 ปี : 10 ml | | | |
| 3 | Co-trimoxazole suspension (SMX/TMP) suspension (200/40) | โรคติดเชื้อทั่วไป 6-12 MKDay of TMP | แบ่งให้ทุก 12 ชั่วโมง | | 1.9-3.8 | 3.8-7.5 | 5.6-11.3 | 7.5-15 |
| | | UTI treatment : 8-10 MKDay of TMP | แบ่งให้ทุก 12 ชั่วโมง | 14 วัน | 2.5-3.1 | 5.0-6.3 | 7.5-9.4 | 10-12.5 |
| 4 | Chlorpheniramine syrup 2 mg/ 5 ml (60 ml/ขวด) | Allergic rhinitis 0.35 MKDay | แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง | | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 5.8 |
| 5 | Dicloxacillin dry syrup 62.5 mg/5 ml (60 ml/ขวด) | 25.50 MKDay | แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง | | 2.5-5 | 5-10 | 7.5-15 | 10-20 |
| 6 | Domperidone suspension 5 mg / 5 ml (30 ml/ขวด) | 0.25 MKDay | วันละ 3 ครั้ง | | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 |
| 7 | Erythromycin dry syrup 125 mg/5 ml (60 ml/ขวด) | 30 - 50 MKDay | แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง | | 1.5-2.5 | 3-5 | 4.5-7.5 | 6-10 |

| ลำดับ | ชื่อยา | ขนาดยา | ความถี่ การบริหารยา | ระยะเวลา | ขนาดการใช้ยา (ml/dose) | | | |
|-------|---|--|-------------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| 8 | Ferrous fumarate (drop) suspension 45 mg/0.6 ml(iron elemental 15 mg) (15 ml/ขวด) | รักษา: 4-6 MKDay | วันละ 1 ครั้ง | | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 2.4-3.6 | 3.2-4.8 |
| | | | วันละ 3 ครั้ง | | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.1-1.6 |
| | | ป้องกัน: 2-4 MKDay | วันละ 1 ครั้ง | | 0.4-0.8 | 0.8-1.6 | 1.2-2.4 | 1.6-3.2 |
| | | | วันละ 3 ครั้ง | | 0.1-0.3 | 0.3-0.5 | 0.4-0.8 | 0.5-1.1 |
| 9 | Ferric hydroxide polymaltose complex(Eurofer syrup) 10 mg Fe/ml (60 ml/ขวด) | เด็กอายุ 6 เดือน - 12 ปี รักษา Anemia : 4-6 MKDay | วันละ 1 ครั้ง | | 2-3 | 4-6 | 6-9 | 8-12 |
| | | | วันละ 3 ครั้ง | | 0.7-1 | 1.3-2 | 2-3 | 2.7-4 |
| | | เด็กอายุ 6 เดือน - 12 ปี ป้องกัน Anemia : 2-4 MKDay | วันละ 1 ครั้ง | | 1-2 | 2-4 | 3-6 | 4-8 |
| | | | วันละ 3 ครั้ง | | 0.3-0.7 | 0.7-1.3 | 1-2 | 1.3-2.7 |
| 10 | Glyceryl guaiacolate syrup 100 mg/5 ml (60 ml/ขวด) | | วันละ 3-4 ครั้ง | | อายุ < 2 ปี : 1-2.5 ml | | | |
| | | | | | 2-5 ปี : 2.5-5 ml | | | |
| 11 | Hydroxycine syrup 10 mg/5 ml (60 ml/ขวด) | 1-2 MKDay | แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง | | 0.8-1.7 | 1.7-3.3 | 2.5-5.0 | 3.3-6.7 |
| 12 | Hyoscine-N-Butylbromide syrup 5 mg/5 ml(30 ml/ขวด) | | ทุก 6-8 ชั่วโมง | | อายุ < 1 ปี : 2.5 ml | | | |
| | | | | | อายุ 1-6 ปี : 5-10 ml | | | |
| | | | | | อายุ > 6 ปี : 10-20 ml | | | |

| ลำดับ | ชื่อยา | ขนาดยา | ความถี่ การบริหารยา | ระยะเวลา | ขนาดการใช้ยา (ml/dose) | | | |
|-------|--|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------|----------|--------|
| | | | | | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| 13 | Ibuprofen suspension 100 mg/5 ml (60 ml/ขวด) | อายุ 6 เดือน : 5-10 MKDose | วันละ 3 ครั้ง | | 1.25-2.5 | 2.5-5 | 3.75-7.5 | 5-10 |
| 14 | Mebendazole suspension 100 mg/5 ml (30ml/ขวด) ไม่ควรใช้ในเด็กต่ำกว่า 6 เดือน | พยาธิเส้นด้าย | ครั้งเดียว | วันเดียว | อายุ \geq 2 ปี : 5 ml | | | |
| | | พยาธิแส้ม้า ไส้เดือน ปากขอ | ทุก 12 ชั่วโมง | 3 วัน | อายุ \geq 2 ปี : 5 ml | | | |
| 15 | MTV Syrup (60ml/ขวด) | | วันละ 1 ครั้ง | | เด็ก 6-12 ปี : 5 ml | | | |
| 16 | Paracetamol syrup 120 mg/5ml | 10-15 MKDose | ทุก 4-6 ชั่วโมง | | 2.1-3 | 4.2-6 | 6.3-9 | 8.3-13 |
| 17 | Salbutamol syrup 2 mg/5 ml | 0.1 mg/kg/dose (max dose 2 mg) | วันละ 3 ครั้ง | | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 |
| 18 | Simethicone drop 40 mg/0.6 ml (15 ml/ขวด) | อายุ < 2 ปี ; น้ำหนัก < 10.9 kg | วันละ 3-4 ครั้ง | | 0.3 ml | | | |
| | | 2-12 ปี ; น้ำหนัก \geq 10.9kg | วันละ 3-4 ครั้ง | | 0.6 ml | | | |