

ฝ้าระวัง ยา/แลบ จิตเวช

กลุ่มยา	ข้อควรระวัง	Lab อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหลังเริ่มยา 2-3 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Lithium</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leukocytosis</i></li> <li>- <i>EKG Change</i></li> <li>- <i>Hypothyroidism</i></li> <li>- <i>Renal toxicity</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>BUN/ Cr, Electrolyte</i></li> <li>- <i>UA</i></li> <li>- <i>EKG 12 Lead</i></li> <li>- <i>FT<sub>3</sub>, FT<sub>4</sub>, TSH</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fluoxetine (SSRI)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามให้ร่วมกับ <i>Thiomidazine</i>, ยากลุ่ม <i>MAOI</i></li> <li>- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์</li> </ul>	<p style="text-align: center;">-</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>CPZ</i></li> <li>- <i>Haldol</i></li> <li>- <i>Perphenazine</i></li> <li>- <i>Fluphenazine</i></li> <li>- <i>Risperidone</i></li> <li>- <i>Dapakin</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cholestatic jx ,Hepatic Impairment</i></li> <li>- <i>EKG Change</i></li> <li>- <i>Anti cholinergic effects</i></li> <li>- <i>Agramlocytosis , TTP</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>CBC</i></li> <li>- <i>LFT</i></li> <li>- <i>EKG</i></li> <li>- <i>Cr</i></li> </ul>
<p>(TCA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Amitriptyline</i></li> <li>- <i>Nortrip</i></li> <li>- <i>Imipramine</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Arrhythmia (QT สูง), Hepatic impairment</i></li> <li>- <i>Leucofenia</i></li> <li>- <i>Glaucoma</i></li> <li>- ห้ามใช้ในผู้ป่วย <i>MI</i></li> <li>- ห้ามใช้ร่วมกับกลุ่มยา <i>MAOI</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>LFT</i></li> <li>- <i>EKG</i></li> <li>- <i>Cr</i></li> </ul>